



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

Anakinra (Kineret)



¿QUÉ ES?

Anakinra es un medicamento biológico que ayuda a disminuir la inflamación en la artritis reumatoide [AR] y otras enfermedades inflamatorias. Anakinra está aprobada por la FDA para tratar la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal [NOMID]. Aunque no está aprobada

por la FDA, la anakinra se usa a veces para la artritis idiopática juvenil sistémica [SJIA], la enfermedad de Still del adulto [AOSD], la gota, la deposición de pirofosfato de calcio [CPPD, antes llamada pseudogota], el síndrome de Behcet, la espondilitis anquilosante, la uveítis y otros síndromes autoinflamatorios.




CÓMO TOMARLO

Para la AR, la dosis estándar es de 100 mg por día inyectados debajo de la piel. En niños con enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal [NOMID] y otras enfermedades autoinflamatorias, la dosis se ajusta según el peso del paciente. En niños, la dosis inicial es de 1-2 mg/kg al día. La dosis se puede tomar cada dos días en pacientes con función renal disminuida. Anakinra es eficaz por sí misma. En el caso de la AR, se puede tomar anakinra con metotrexato.

La anakinra debe almacenarse en un refrigerador y llevarse a temperatura ambiente antes de usar. Una enfermera o un médico puede enseñar a los pacientes

cómo administrarse las inyecciones. A menudo, es útil llevar a un cónyuge o amigo para aprender a aplicar las inyecciones. La anakinra se puede inyectar en la parte frontal del muslo o el abdomen. Los sitios de inyección deben rotarse para que el mismo sitio no se use repetidamente.

Anakinra alivia los síntomas de la AR en 4 a 6 semanas. En NOMID, artritis idiopática juvenil sistémica, gota de la enfermedad de Still del adulto y otros trastornos autoinflamatorios, la anakinra puede comenzar a aliviar los síntomas en cuestión de horas.



EFFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios más comunes son reacciones en el lugar de la inyección, como enrojecimiento, picazón, erupción y dolor. También pueden ocurrir moretones o sangrado, pero es raro. Estos efectos generalmente se detienen después de 1-2 semanas. Pueden ocurrir dolores de cabeza y recuentos bajos de glóbulos blancos, pero estos son muy raros.

Anakinra no tiene interacciones conocidas con otros medicamentos. Anakinra no debe usarse al mismo tiempo que otros productos biológicos, ya que aumentan el riesgo de infección.



DIGALE A SU MÉDICO

Anakinra puede aumentar su riesgo de infección. Consulte a su médico si no se siente bien o si tiene fiebre. Su médico puede suspender la anakinra e iniciar antibióticos, si es necesario. La anakinra bloquea una de las vías que causan la inflamación; esta vía también

se usa para combatir infecciones. Los pacientes que toman anakinra no deben recibir vacunas vivas, como ciertas formas de la vacuna contra la influenza, el herpes zóster y la fiebre amarilla. Por favor consulte a su médico de antemano.