



## HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


# Azatioprina (Imuran)



### ¿QUÉ ES?

**Azatioprina (Imuran) se utiliza para tratar la dermatomiositis, el lupus eritematoso sistémico (lupus), la enfermedad inflamatoria intestinal, la vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos), la artritis reumatoide y otras afecciones inflamatorias.** Suprime el sistema inmunológico al interferir con


la síntesis de ADN [la creación de moléculas de ADN]. También se usa en combinación con otros medicamentos para suprimir el sistema inmunológico después del trasplante de órganos para prevenir el rechazo de los órganos trasplantados.



### CÓMO TOMARLO

**La azatioprina generalmente se toma por vía oral (en dosis entre 50 y 150 mg), una o dos veces al día.** La dosis inicial para la artritis reumatoide es de aproximadamente 1 miligramo/kilogramo [mg/kg] de peso corporal. La dosis puede aumentarse cada 1-2

meses, hasta una dosis máxima de 2,5 mg/kg de peso corporal, o aproximadamente 75 a 150 mg dos veces al día. Un beneficio en la artritis u otras afecciones puede aparecer tan pronto como 6-8 semanas. Puede tomar hasta 12 semanas para notar un efecto completo.



### EFFECTOS SECUNDARIOS

**Los efectos secundarios más comunes de la azatioprina pueden afectar al tracto gastrointestinal (que incluye el estómago, los intestinos, el hígado y el páncreas) y las células sanguíneas.** Tomar el medicamento dos veces al día en lugar de una sola vez, o tomarlo después de comer, puede ayudar a evitar estos problemas. Con menos frecuencia, la azatioprina puede causar daño al hígado, páncreas o una reacción alérgica que puede incluir una enfermedad similar a la gripe o una erupción. La azatioprina

también puede reducir el número de glóbulos blancos que combaten las infecciones. Antes o durante el tratamiento, su médico puede realizar un análisis de sangre denominado nivel de actividad TPMT. TPMT ayuda a eliminar la medicación de su sistema. Si tiene cantidades más bajas de TPMT, puede tener un riesgo más alto de toxicidad por medicamentos. Es importante tomar azatioprina según las indicaciones y realizarse análisis de sangre periódicos.



### DIGALE A SU MÉDICO

**Debe notificar a su médico si tiene estos síntomas mientras toma este medicamento: fiebre, erupción, moretones o sangrado fáciles, o signos de una infección.** Si se producen vómitos, debe comunicarse con su médico, ya que esto puede ser un signo de una reacción grave. Asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, que pueden incluir medicamentos de venta libre y remedios naturales. Los medicamentos que pueden interferir con la azatioprina y potencialmente causar problemas serios incluyen el medicamento para la gota alopurinol [Aloprim, Zyloprim]; warfarina [Coumadin]; algunos medicamentos para la presión arterial, incluidos algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [ACE] [Accupril o Vasotec]; olsalazina [Dipentum];

mesalamina [Asacol, Pentasa]; y sulfasalazina [Azulfidina]. Asegúrese de notificar a sus otros médicos mientras esté tomando este medicamento. Si está embarazada o está considerando un embarazo, informe a su médico antes de comenzar a tomar este medicamento, aunque se puede tomar azatioprina durante el embarazo. Se debe evitar la lactancia materna mientras se toma azathioprine porque el medicamento puede pasar a la leche materna. Asegúrese de hablar con su médico antes de recibir cualquier vacuna o someterse a una cirugía mientras esté tomando este medicamento. Deben evitarse las vacunas vivas mientras esté tomando este medicamento y debe hablar sobre la actualización de sus vacunas antes de comenzar a tomar esta medicación.