



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


Ciclofosfamida (Cytosan)



¿QUÉ ES?

La ciclofosfamida (Cytosan) es un potente fármaco inmunosupresor que disminuye la respuesta inmunológica al bloquear la producción de ADN en las células inmunitarias. La ciclofosfamida se usa


para las complicaciones graves del lupus; esclerosis sistémica [esclerodermia]; algunas formas de vasculitis; miopatías tales como polimiositis y dermatomiositis; y, a veces, artritis reumatoide.



CÓMO TOMARLO

La ciclofosfamida a menudo se usa durante 3-6 meses para poner una enfermedad en remisión. Posteriormente, se utiliza un medicamento que puede ser menos potente con menos efectos secundarios para mantener la enfermedad bajo control. La ciclofosfamida se puede tomar por vía oral todos los días o se puede administrar mediante una inyección aplicada en el

consultorio del médico o en el hospital cada semana o cada mes. La dosificación de ciclofosfamida varía de persona a persona y depende de la enfermedad que se esté tratando. Los síntomas pueden tardar varias semanas en mejorar y el efecto completo puede durar varios meses o más.



EFFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios comunes, que pueden empeorar con la forma píldora, incluyen náuseas y vómitos. Estos síntomas generalmente se pueden controlar con medicamentos contra las náuseas. Puede ocurrir pérdida de cabello, pero generalmente volverá a crecer cuando se suspenda el medicamento. Otros efectos secundarios comunes incluyen erupciones en la piel. La ciclofosfamida también puede aumentar el riesgo de desarrollar algunos tipos de infecciones, especialmente la "culebrilla". La ciclofosfamida puede causar una reducción del número de glóbulos blancos y hacer que usted sea más propenso a las infecciones. Esto puede ocurrir de 8 a 12 días después de comenzar

el tratamiento. Su médico revisará sus recuentos sanguíneos en ese momento y hará los ajustes de dosis según sea necesario. La ciclofosfamida puede causar infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Aunque las mujeres que toman ciclofosfamida pueden dejar de tener períodos, pueden quedar embarazadas, por lo que se debe usar un método anticonceptivo eficaz para prevenir el embarazo mientras se toma este medicamento, ya que la ciclofosfamida puede causar daño fetal. La ciclofosfamida puede producir sangre en la orina o cicatrización de la vejiga. Los pacientes que toman ciclofosfamida oral deben tomar muchos líquidos todos los días para ayudar a prevenir problemas.



DIGALE A SU MÉDICO

Antes de comenzar la ciclofosfamida, informe a su médico todos los medicamentos que está tomando, incluidos los medicamentos de venta libre y los suplementos de hierbas. Informe a todos sus médicos cuando tome este medicamento o si le han administrado este medicamento en el pasado. Hay algunos riesgos a largo plazo que deben considerarse incluso años después de tomar el medicamento. Las vacunas vivas deben evitarse mientras se toma este medicamento, y se debe

tener precaución si algún miembro del hogar recibe vacunas vivas. Debe hablar sobre la actualización de sus vacunas antes de comenzar a tomar este medicamento. Las mujeres embarazadas o que estén considerando quedar embarazadas deben consultar con su médico antes de tomar este medicamento. Si nota lo siguiente, debe comunicarse con su médico: sangre en la orina, fiebre o escalofríos, moretones o sangrado con facilidad, dificultad para respirar y/o hinchazón de los pies y tobillos.