



## HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


# Citrato de Tofacitinib (Xeljanz)



### ¿QUÉ ES?

**El tofacitinib (Xeljanz) es un medicamento oral que se usa para tratar a los adultos con artritis reumatoide (RA) activa moderada a grave en los casos en que el metotrexato no funcionó bien y la artritis psoriásica.** El tofacitinib actúa bloqueando


la producción de enzimas llamadas Janus quinasas (JAK). Los JAK desempeñan un papel en la inflamación articular en la AR, que puede causar dolor, hinchazón y rigidez.



### CÓMO TOMARLO

**El tofacitinib es una píldora que se toma como 5 mg dos veces al día (Xeljanz) o como 11 mg una vez al día (Xeljanz XR).** Puede tomar las tabletas de tofacitinib con o sin alimentos. Las personas con insuficiencia renal de moderada a grave o insuficiencia hepática moderada deben tomar solo una tableta de 5 mg por día. El tofacitinib se puede usar solo o en combinación con metotrexato u otros DMAR. El tofacitinib no debe administrarse en combinación con otro fármaco

biológico u otros inmunosupresores potentes, como la azatioprina o el micofenolato. Algunos pacientes comenzarán a ver una mejoría dentro de unas pocas semanas, pero puede tomar varios meses para tener efecto completo. Mientras toma el tofacitinib, para controlar el aumento de colesterol o las enzimas hepáticas y la reducción del recuento de células sanguíneas, se usarán análisis de sangre.



### EFFECTOS SECUNDARIOS

**El tofacitinib puede disminuir la capacidad de su sistema inmunológico para combatir infecciones.**

Los efectos secundarios más comunes del tofacitinib son infecciones del tracto respiratorio superior, dolor de cabeza, diarrea y nasofaringitis. Todos los pacientes deben someterse a una prueba de tuberculosis antes de comenzar a tomar tofacitinib. Los pacientes también deben someterse a exámenes de detección de hepatitis B y C antes de comenzar a tomar el tofacitinib, ya

que este medicamento puede aumentar el riesgo de reactivación de estas infecciones. El tofacitinib se ha asociado con un aumento de los niveles de colesterol en algunos pacientes y debe monitorearse periódicamente. Si su nivel de colesterol se eleva demasiado, es posible que deba comenzar a tomar un medicamento para disminuirlo. Se han observado linfomas y otras neoplasias malignas en pacientes tratados con tofacitinib.



### DIGALE A SU MÉDICO

**Comuníquese con su médico si presenta síntomas de una infección, como fiebre o tos, o si cree que tiene algún efecto secundario (como dolor abdominal, movimientos intestinales con sangre o reacciones alérgicas).** Informe a su médico si queda embarazada o está planeando un embarazo, o si está amamantando. Asegúrese de hablar con su médico antes de recibir cualquier vacuna o someterse a una cirugía. Deben

evitarse las vacunas vivas mientras esté tomando este medicamento y debe hablar sobre la actualización de sus vacunas antes de comenzar a tomar este medicamento. Estas incluyen la vacuna contra el herpes zóster, la vacuna contra la gripe en aerosol nasal y otras como las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la fiebre amarilla.