



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


Colchicine (Colcris, Mitigare)



¿QUÉ ES?


La colchicina es un medicamento utilizado para tratar algunos trastornos inflamatorios. En los niños, la colchicina se usa más comúnmente para tratar la fiebre mediterránea familiar (FMF), la enfermedad de Behcet y la estomatitis aftosa recurrente. En los

adultos, se usa más comúnmente para tratar la gota. En el tratamiento de la FMF, reduce la frecuencia de los ataques de fiebre y artritis, y previene las complicaciones de la FMF.



CÓMO TOMARLO

La colchicina es una píldora que generalmente se toma dos veces al día. Se presenta en una tableta de 0,6 mg. Los pacientes suelen comenzar con una dosis baja (por ejemplo, 0,3 mg una o dos veces al día), y la dosis aumenta lentamente si es necesario. La dosis máxima no suele ser superior a 1,8 mg al día.



EFFECTOS SECUNDARIOS

El efecto secundario más común de la colchicina es la diarrea. La diarrea puede ocurrir hasta en el 10% de las personas que la toman. También pueden ocurrir otros síntomas gastrointestinales, como náuseas y

vómitos. Es posible que haya que reducir las dosis si se presentan estos síntomas. La colchicina se considera segura cuando se toma en la dosis correcta, pero una sobredosis de la medicación puede ser letal.



DIGALE A SU MÉDICO

Informe a su médico si experimenta diarrea, náuseas, vómitos o dolor abdominal mientras toma este medicamento. Esto puede ser una señal de que su dosis de colchicina es demasiado alta. Algunos medicamentos pueden interferir con la colchicina y aumentar el riesgo de efectos secundarios graves. Algunos de estos medicamentos incluyen claritromicina, fluoxetina, paroxetina, cimetidina y algunas terapias antifúngicas.

El jugo de toronja también puede interferir con este medicamento, así que evite el jugo de toronja cuando esté tomando colchicina. Informe a su médico si tiene problemas de riñón o hígado antes de comenzar a tomar este medicamento, ya que es posible que deba ajustar las dosis. Por favor, hable con su médico si está embarazada, amamantando o planea quedar embarazada.

Escrito en marzo de Comisión de Especial de Reumatología Pediátrica, y revisado por la Comité de Marketing y Comunicaciones del Colegio Estadounidense de Reumatología. La presente información se proporciona con el único fin de brindar educación general. Para el asesoramiento médico profesional, el diagnóstico y el tratamiento de afecciones médicas o de salud, consulte a un proveedor de atención médica calificado.

© 2019 Colegio Estadounidense de Reumatología

**AMERICAN COLLEGE
of RHEUMATOLOGY**
Empowering Rheumatology Professionals