



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


Denosumab (Prolia)



¿QUÉ ES?

Denosumab (Prolia) es un medicamento biológico que se usa para prevenir los huesos frágiles, también conocido como osteoporosis y fracturas óseas. Como medicamento biológico, es sintético y se asemeja mucho a los anticuerpos naturales en el cuerpo. En este caso, detiene una molécula, llamada RANKL, que


normalmente causa el recambio óseo. Al bloquear RANKL, ayuda a fortalecer los huesos. En general, el denosumab no se considera tratamiento de primera línea para administrar en la osteoporosis, sino cuando el paciente no pueden tomar bifosfonatos o no tienen resultados satisfactorios.



CÓMO TOMARLO

Denosumab se administra como una inyección justo debajo de la piel. Lo administra su médico o enfermera. La dosis habitual es de 60 mg cada seis meses, y se debe tomar con suplementos de calcio [1000-1200 mg diarios] y vitamina D [al menos 400 UI]. Denosumab actúa

rápidamente: dentro de los tres días posteriores a la inyección, los efectos en la reducción del recambio óseo pueden detectarse en la sangre; El medicamento también permanece en la sangre durante varios meses después de suspender el medicamento.



EFFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios más comunes que experimentan los pacientes son dolor de espalda, dolor en las manos y los pies y aumento del colesterol.

El dolor del denosumab puede durar desde unos pocos días hasta unos pocos meses después de la administración. Los efectos secundarios más raros, pero preocupantes, incluyen un mayor riesgo de infecciones

[especialmente si ya está tomando medicamentos que reducen su sistema inmunológico], niveles bajos de calcio (llamada hipocalcemia), pérdida de suministro de sangre a la mandíbula (llamada osteonecrosis de la mandíbula), fractura atípica de la pierna y reacciones alérgicas graves.



DIGALE A SU MÉDICO

Sin embargo, algunos síntomas pueden aparecer normalmente mientras toma denosumab. Debe informar a su médico si tiene estos síntomas mientras toma este medicamento: hormigueo en las manos o alrededor de la boca, dolor nuevo en la mandíbula o fiebre u otros signos de infección. Asegúrese de notificar a sus otros médicos mientras esté tomando este medicamento. Si

está embarazada o está considerando un embarazo, informe a su médico antes de comenzar a tomar este medicamento. Las mujeres deben discutir sobre el control de la natalidad con sus médicos de atención primaria o ginecólogos. Debe evitarse la lactancia materna mientras toma denosumab porque el medicamento puede ingresar a la leche materna.