



## HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

# Febuxostat (Uloric)



### ¿QUÉ ES?


**Febuxostat (Uloric) es un medicamento que reduce los niveles de ácido úrico en el cuerpo.** Se utiliza para el tratamiento crónico de la gota. Bloquea el sitio activo en la xantina oxidasa, evitando la conversión de hipoxantina y xantina a ácido úrico. Esto, a su vez, disminuye los niveles de ácido úrico en la sangre y por lo tanto ayuda a prevenir los brotes de gota.



### CÓMO TOMARLO

**Febuxostat viene en forma de píldora.** Se recomienda iniciar febuxostat a 40 mg al día. Si los pacientes no pueden alcanzar un nivel meta de ácido úrico en suero de <6 mg/dL (o <5 mg/dL en algunos pacientes) después de dos semanas, la medicación debe aumentarse a 80 mg al día. El febuxostat debe iniciarse junto con un medicamento para prevenir los brotes de gota, como la

colchicina o los AINE. Febuxostat no necesita tomarse con las comidas. Para daños leves de hígado o riñón, no es necesario ajustar la dosis. No hay estudios que evalúen este medicamento en pacientes con daño renal o hepático grave; por lo tanto, se debe tener precaución al prescribir febuxostat en esta población de pacientes.



### EFFECTOS SECUNDARIOS

**Este medicamento no debe usarse en pacientes que estén tomando azatioprina o mercaptopurina, ya que estos medicamentos pueden aumentar los niveles séricos de febuxostat en la sangre, lo que provoca efectos secundarios tóxicos.** Además de las enzimas hepáticas elevadas, el dolor de cabeza, el dolor articular y la erupción pueden ser efectos secundarios de este medicamento. Se observaron tasas más altas de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en pacientes que tomaron febuxostat en comparación con alopurinol.

También se han observado ataques de gota más frecuentes en pacientes al iniciar febuxostat. Si se produce una mayor cantidad de ataques de gota en los primeros meses después de comenzar con este medicamento, se debe indicar un tratamiento sintomático con AINE para tratar los brotes agudos, pero no se debe suspender el febuxostat.



### DIGALE A SU MÉDICO

**Si nota dolor torácico, presión en el tórax, dificultad para respirar, debilidad o deficiencias neurológicas, informe a su médico de inmediato.** Si está tomando algún otro medicamento que pueda interactuar con esta medicina, informe a su médico. Si comienza a experimentar dolor en las articulaciones o erupciones, avise también a su médico, ya que es posible que deba ajustar la dosis del medicamento.