



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

Lesinurad (Zurampic)



¿QUÉ ES?

El lesinurad (Zurampic) se usa para tratar pacientes con gota. En la gota, los niveles altos de ácido úrico hacen que el exceso de cristales de urato se deposite en la articulación, creando una articulación inflamada,


dolorosa y caliente; la manifestación primaria de la gota. El lesinurad disminuye los niveles de ácido úrico al incrementar la cantidad eliminada en la orina.



CÓMO TOMARLO

El lesinurad se toma una vez al día como una tableta por vía oral en combinación con un inhibidor de la xantina oxidasa, como el alopurinol o el febuxostat. No se recomienda tomar el lesinurad sin un inhibidor de la xantina

oxidasa. Si se toma solo, tiene una alta probabilidad de causar insuficiencia renal. Si omite una dosis de la mañana, no tome medicamentos adicionales para compensarla. Continúe con la siguiente dosis al día siguiente.



EFFECTOS SECUNDARIOS

El efecto secundario más preocupante del lesinurad es que puede causar daño e insuficiencia renal. No debe usar lesinurad si es alérgico a él, si tiene insuficiencia renal o hepática, si es un paciente en diálisis, si tiene un trasplante renal o si tiene el síndrome de Lesch-Nyhan.

También debe evitarse si tiene síndrome de lisis tumoral. Los efectos secundarios menores incluyen dolor de cabeza, síntomas similares a la gripe y acidez estomacal. Los efectos del lesinurad en un bebé no nacido son desconocidos. También se desconoce si pasa a la leche materna.



DIGALE A SU MÉDICO

La aspirina puede disminuir la eficacia de este medicamento. Si está tomando aspirina recetada para una afección médica, informe a su médico. El lesinurad puede hacer que las pastillas anticonceptivas sean menos efectivas. Dígale a su médico si usted está tomando píldoras anticonceptivas. Si comienza a experimentar

síntomas de deshidratación, cambios en la orina o dolor en el flanco, informe a su médico. No hay evidencia clara acerca del uso de este medicamento durante el embarazo. Si está pensando quedar o ya está embarazada, hable con su médico antes de comenzar a tomar este medicamento.