



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

Metilprednisolona intravenosa (IV) (Solu-medrol)



¿QUE ES?

La metilprednisolona es parte de una potente clase de agentes antiinflamatorios, conocidos como corticosteroides. Los corticosteroides se utilizan para tratar muchas enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, el corticosteroide prednisona se usa comúnmente para tratar la artritis reumatoide, el lupus, la vasculitis, la dermatomiositis, y muchas otras afecciones. La metilprednisolona es similar a la prednisona, pero se puede administrar en dosis más altas como una infusión en una vena (intravenosa, IV) para el tratamiento de la


inflamación grave. Ejemplos de afecciones en las que se usa habitualmente la metilprednisolona IV incluyen el lupus que afecta los riñones o el cerebro y algunos tipos de vasculitis. La metilprednisolona intravenosa también se administra como "medicación previa" en dosis más bajas para prevenir las reacciones de infusión a otros medicamentos como el rituximab.



CÓMO TOMARLA

La metilprednisolona intravenosa se administra en un hospital o centro de infusión ambulatoria. Primero, se coloca una vía intravenosa (generalmente en el brazo) y luego se administra la infusión durante 1 a 3 horas bajo la supervisión de los proveedores de

atención de salud. La dosis y el tiempo de la infusión serán determinados por su médico. Algunas personas requieren infusiones más lentas si experimentan efectos secundarios durante la infusión.



EFECTOS SECUNDARIOS

La metilprednisolona puede causar efectos secundarios a corto y largo plazo. Los efectos secundarios que pueden ocurrir durante o poco después de una infusión incluyen cambios en la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca irregular, desequilibrios electrolíticos, aumento de azúcar en la sangre, enrojecimiento de la piel, sudoración, sabor metálico, dificultad para dormir, cambios de humor o comportamiento, psicosis, convulsiones, aumento de la susceptibilidad a la infección y anafilaxis (reacción alérgica grave).

Si necesita tomar metilprednisolona IV o prednisona oral de forma continua, los efectos secundarios a largo plazo de los corticosteroides incluyen (entre otros) aumento de peso, acné, adelgazamiento de la piel, estrías, niveles elevados de azúcar en la sangre, niveles elevados de colesterol, úlceras pépticas, cataratas, glaucoma, aumento de peso, disminución de la densidad ósea, mayor riesgo de osteonecrosis ósea, supresión del crecimiento, pérdida de masa muscular y mayor susceptibilidad a las infecciones.



DIGALE A SU MÉDICO

Informe a su médico si le preocupa que pueda estar experimentando efectos secundarios, o si presenta fiebre o algún síntoma nuevo después de comenzar a tomar este medicamento, ya que puede aumentar el riesgo de infección. Si pierde una infusión programada,

notifique a su médico. Hable con su médico acerca de qué vacunas son apropiadas para usted. Si está embarazada o está considerando un embarazo, hable con su médico antes de comenzar con el medicamento.