



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


Micofenolato mofetil (Cellcept) y micofenolato sódico (Myfortic)



¿QUÉ ES?

El mycophenolate mofetil (CellCept) y el micofenolato sódico (Myfortic) son medicamentos inmunosupresores (una clase de medicamentos que reducen la fuerza del sistema inmunológico del cuerpo) utilizados en el tratamiento de varias enfermedades autoinmunes. El micofenolato se utilizó originalmente en el tratamiento de pacientes con trasplantes de órganos, pero ahora se recomienda en el tratamiento de muchas enfermedades


autoinmunes. El micofenolato se ha utilizado para tratar a personas con lupus (especialmente aquellos con síntomas de enfermedad renal), artritis reumatoide [RA], vasculitis, enfermedad inflamatoria del intestino como la enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria del ojo (como uveítis, iritis y escleritis), y Algunos otros trastornos renales y cutáneos.



CÓMO TOMARLO

Los cuidadores que administran el micofenolato deben usar guantes cuando lo manejan debido a la preocupación por los riesgos del embarazo y los efectos en el sistema inmunológico. En los adultos, el micofenolato generalmente se toma dos veces al día para una dosis total de 2 a 3 gramos (2000 a 3000 mg) por día, aunque esta dosis puede reducirse en personas

con problemas renales subyacentes. La dosis suele ser inferior a 2 gramos al día para los niños. Tomar el micofenolato con alimentos a menudo ayuda a prevenir efectos secundarios como náuseas o dolor de estómago. Se requiere un monitoreo regular de laboratorio para controlar los recuentos sanguíneos y su hígado mientras toma el micofenolato.



EFFECTOS SECUNDARIOS

El micofenolato puede disminuir la capacidad de su sistema inmunológico para combatir infecciones. Si presenta síntomas de una infección mientras usa este medicamento, debe suspenderlo y comunicarse con su médico. Los efectos secundarios más comunes del micofenolato son náuseas y malestar estomacal. Otros

posibles efectos secundarios incluyen dolores de cabeza, mareos, dificultad para dormir, temblores o erupción cutánea. El uso prolongado del micofenolato puede aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer, como linfomas y cáncer de piel.



DIGALE A SU MÉDICO

Debe notificar a su médico si tiene estos síntomas mientras toma este medicamento: una infección (como fiebre o tos), diarrea o reacciones alérgicas. Asegúrese de notificar a sus otros médicos mientras esté tomando este medicamento. El micofenolato se ha asociado con defectos de nacimiento y pérdida del embarazo. Si está embarazada o está considerando un embarazo, informe a su médico antes de comenzar a tomar este medicamento. Las mujeres deben discutir sobre el control de la natalidad con sus médicos de atención primaria o ginecólogos. Debe evitarse la lactancia materna mientras toma este medicamento, ya que puede ingresar a la leche materna. Asegúrese de hablar con su médico antes de recibir

cualquier vacuna o someterse a una cirugía mientras esté tomando este medicamento. Deben evitarse las vacunas vivas mientras esté tomando este medicamento y debe hablar sobre la actualización de sus vacunas antes de comenzar a tomar este medicamento. Estos incluyen la vacuna contra la culebrilla más antigua (Zostavax), la vacuna contra la gripe en aerosol nasal, las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la fiebre amarilla. Notifique a su médico si presenta moretones o sangrados con facilidad, o si experimenta diarrea persistente o con sangre, falta de aire al respirar, fiebre o cualquier otro signo de infección. El uso de micofenolato debe detenerse si hay signos de una infección.