



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

Minociclina (Minocin)



¿QUÉ ES?


La minociclina (minocina) es un antibiótico antiinflamatorio que se usa a veces para tratar la artritis reumatoide leve (RA). Perteneció al grupo de antibióticos, llamado tetraciclina, que generalmente se usa para tratar infecciones. Aunque no se piensa que la RA sea

causada por una infección, la minociclina puede mejorar los signos y síntomas de esta enfermedad. Debido a que se ha estudiado menos y puede ser menos eficaz que otras opciones, no es tan comúnmente prescrito en la RA.



CÓMO TOMARLO

La minociclina por lo general se toma como una cápsula de 100 mg dos veces al día. Puede tomarse con alimentos, pero no debe tomarse con otros medicamentos como los antiácidos o las tabletas de hierro. Tiene un inicio lento y puede tardar varios meses en funcionar.



EFFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son molestias gastrointestinales, mareos y erupción cutánea. Los pacientes que toman este medicamento durante mucho tiempo pueden notar cambios en el color de su piel, pero esto generalmente se resuelve después de suspender la medicina. Algunas mujeres que toman minociclina desarrollan infecciones vaginales por hongos. La minociclina puede aumentar la sensibilidad a la luz solar, lo que ocasiona quemaduras solares más frecuentes o el desarrollo de erupciones después de la exposición solar. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y usar un protector solar. En raras ocasiones, la minociclina puede afectar los riñones o el hígado. Los médicos pueden recomendar exámenes de sangre periódicos para que los usuarios

a largo plazo chequeen la función hepática y renal. En casos igualmente raros, la minociclina puede causar lupus, inducido por medicamento, pero esta afección generalmente mejora después de suspenderla medicina.

La minociclina pasa a la leche materna, por lo que las madres deben evitar la lactancia materna para prevenir el retraso en el desarrollo de los dientes y huesos en sus bebés. La minociclina, en un niño lactando, puede aumentar el riesgo de infecciones por hongos o mareos. Debido a que la minociclina puede causar decoloración de los dientes y problemas con el crecimiento óseo en niños pequeños, se recomienda que los menores de ocho años no tomen este medicamento. Esto no es un problema en niños mayores y adultos.



DIGALE A SU MÉDICO

Hable con su médico si queda embarazada, planea quedar embarazada o si está amamantando. La minociclina no debe administrarse durante el embarazo ni debe usarse durante la lactancia. Si ha tenido reacciones alérgicas a la minociclina u otros antibióticos del grupo de la tetraciclina, informe a su médico. Asegúrese de informar a su médico acerca de todos los medicamentos

que toma, incluidos los medicamentos de venta libre y los remedios naturales. Pueden ocurrir posibles interacciones con la minociclina al tomar warfarina (Coumadin); antiácidos que contienen calcio, aluminio o magnesio (como Tums, Roloids, Maalox o Mylanta); pastillas de hierro; anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas); tretinoína ("retinoides"); Accutane; Soriatane; y metotrexato.