




HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

Pegloticasa (Krystexxa)



¿QUÉ ES?


La pegloticasa es una proteína que diseñada para tratar la gota crónica severa cuando otros tratamientos más comunes han fracasado o no se toleran. Más específicamente, la proteína es una enzima [una sustancia que produce una acción] que descompone el ácido úrico en una sustancia que el cuerpo puede excretar.



CÓMO TOMARLO

La pegloticase se administra como una infusión, a través de una aguja insertada en una de las venas por un profesional de cuidado de salud. La infusión dura al menos dos horas y se administra cada dos semanas. Se usa en combinación con otro medicamento para prevenir los brotes de gota durante el tratamiento con pegloticase. Antes de recibir cada infusión, es muy importante controlar los niveles de ácido úrico. Si los niveles de ácido

úrico se encuentran por encima de 6 mg/dL a pesar de las infusiones de pegloticasa, esto podría indicar que se han desarrollado anticuerpos contra la pegloticasa, un evento que eventualmente ocurre en casi todos los pacientes que reciben la pegloticasa. Este desarrollo puede resultar en la pérdida de efectividad de la pegloticasa y puede predecir el inicio de una futura reacción a la infusión.



EFFECTOS SECUNDARIOS

La pegloticasa a menudo causa ciertos efectos secundarios. El efecto secundario más común es un ataque de gota, por lo que siempre se debe administrar un medicamento para prevenir un ataque de gota mientras se recibe la pegloticase. La reacción de infusión más grave puede ser la anafilaxia, o una reacción alérgica muy grave, que podría provocar lesiones severas o la muerte si no se

identifica y trata rápidamente. Informe de inmediato a su profesional de cuidado de salud si presenta dificultad para respirar, sibilancias, otros sonidos de respiración inusuales, mareos, dolor en el tórax o hinchazón dentro de la boca.

Otros efectos secundarios reportados incluyen náuseas, picazón, enrojecimiento, moretones, estreñimiento y vómitos.



DIGALE A SU MÉDICO

Antes de tomar la pegloticase, informe a su médico si planea quedar embarazada, o si tiene deficiencia de G6PD o antecedentes familiares de esto. Si tiene deficiencia de G6PD, la pegloticasa no es segura.

Antes de tomar la pegloticasa, informe a su médico si existe alguna razón por la cual no pueda recibir la pegloticasa en los intervalos recomendados de 2 semanas en el futuro inmediato. Como los anticuerpos finalmente se forman en casi todos los pacientes que reciben

pegloticasa, es importante comprometerse a una infusión cada 2 semanas para que el medicamento sea más efectivo.

Durante las infusiones, informe inmediatamente a su profesional de cuidado de salud si presenta dificultad para respirar, sibilancias, otros sonidos de respiración inusuales, mareos, dolor en el tórax o hinchazón dentro de la boca. Esto podría indicar anafilaxis, una reacción potencialmente peligrosa o mortal a la pegloticasa.