



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


Prednisona (Deltasone)



¿QUÉ ES?

La prednisona (Deltasone) forma parte de una potente clase de agentes antiinflamatorios, conocidos como corticosteroides, que se usan para controlar la inflamación de las articulaciones y los órganos. A menudo se usa para tratar una variedad

de afecciones inflamatorias, como enrojecimiento, hinchazón y dolor. La prednisona se usa para tratar la artritis reumatoide, el lupus, la vasculitis y muchas otras enfermedades inflamatorias.




CÓMO TOMARLO

La dosificación de prednisona varía ampliamente según el estado de la enfermedad que se esté tratando.

Las dosis utilizadas en la artritis reumatoide suelen ser de 5 a 10 mg al día, mientras que las dosis necesarias en el lupus y la vasculitis suelen ser de 80 mg al día, o algunas veces son más altas. La prednisona generalmente alcanza su efecto dentro de 1-2 horas. Las tabletas de

liberación retardada surten efecto aproximadamente 6 horas después de tomar la dosis. La prednisona deja de funcionar poco después de suspender el medicamento. Si ha estado tomando prednisona regularmente durante más de 2 semanas, no la suspenda de repente. En su lugar, debe discutir un programa de reducción gradual con su médico.



EFFECTOS SECUNDARIOS

La mayoría de los efectos secundarios están relacionados con la dosis administrada y la duración del tratamiento, por lo que el objetivo es usarla en la dosis efectiva más baja durante el período de tiempo más corto necesario. Algunos efectos secundarios potenciales incluyen moretones con facilidad, osteoporosis (o debilitamiento de los huesos), diabetes, hipertensión, aumento de peso, cataratas, glaucoma y un trastorno óseo llamado necrosis avascular. Aunque la prednisona

rara vez tiene una interacción directa con otros medicamentos, existe un mayor riesgo de infección al combinar la prednisona con otros medicamentos que afectan su sistema inmunológico. Además, cuando se toma prednisona con AINE (como naproxeno o ibuprofeno), puede haber un mayor riesgo de úlceras estomacales. Asegúrese de revisar todos sus medicamentos con su médico en cada visita.



DIGALE A SU MÉDICO

Su médico lo controlará para detectar efectos secundarios. Asegúrese de hablar con su médico sobre cualquier síntoma nuevo que esté experimentando. Hable con su médico acerca de qué vacunas son adecuadas para usted, ya que depende de su dosis de prednisona. Si está embarazada o está considerando un embarazo, hable con su médico antes de comenzar con el medicamento. Aunque la prednisona puede ser necesaria para usar durante el embarazo, las complicaciones

pueden incluir, nacimiento de un feto muerto y parto prematuro. Los bebés nacidos de mujeres que reciben grandes dosis de corticosteroides durante el embarazo pueden desarrollarse glándulas suprarrenales poco activas y también pueden ser más pequeños de lo que se espera al nacer. Los bebés también pueden desarrollar labio leporino y paladar hendido. Aunque parte del medicamento pasa a la leche materna, la prednisona parece ser segura durante la lactancia.