



## HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

# Rituximab (Rituxan y MabThera)



### ¿QUÉ ES?

**El rituximab (Rituxan y MabThera) es un medicamento que se usa para tratar la artritis reumatoide y ciertas formas de vasculitis que no ha mejorado con otros tipos de medicamentos.** Funciona apagando una parte del sistema inmunológico que no funciona correctamente en las enfermedades autoinmunes. El rituximab se usa en combinación con el metotrexato para tratar la artritis reumatoide que no ha respondido a uno o más tipos de tratamiento, incluidos los inhibidores


del TNF. El rituximab también se usa para tratar ciertos tipos de vasculitis (una afección inflamatoria que afecta a los vasos sanguíneos), como la granulomatosis con poliangitis o MPA. Ocasionalmente, el rituximab se usa para tratar otros problemas inmunitarios, como lupus y enfermedades inflamatorias de los músculos. El rituximab también se usa en el tratamiento de algunos trastornos de la sangre, como la leucemia linfocítica crónica y el linfoma no Hodgkin.



### CÓMO TOMARLO

**El rituximab se administra como una infusión intravenosa (IV o "goteo") dentro de una vena.** La infusión generalmente toma de 2 a 4 horas, aunque ocasionalmente puede tomar más tiempo. Un curso de rituximab para la artritis reumatoide generalmente consiste en dos dosis de 1000 mg administradas con 15 días de diferencia. Para otras condiciones,

se puede usar este régimen o se puede administrar una dosis más pequeña una vez a la semana durante 4 semanas seguidas. Los efectos del rituximab comienzan aproximadamente 6 semanas después de las infusiones. Por lo general, para el tercer mes, se produce el efecto completo y puede durar hasta 9 meses.



### EFFECTOS SECUNDARIOS

**A veces, la presión arterial de los pacientes puede disminuir durante el tratamiento. Aquellos que toman medicamentos para bajar su presión arterial deben suspenderlos antes de la infusión.** Algunos pacientes sienten efectos secundarios leves durante o hasta 24 horas después de recibir el rituximab. Esto suele ocurrir con las primeras infusiones, y puede incluir un leve estrechamiento de la garganta, síntomas parecidos a la gripe, erupción cutánea, picazón, mareos y dolor de espalda, náuseas, malestar estomacal, sudoración, nerviosismo, rigidez muscular y entumecimiento. Estos síntomas pueden reducirse al recibir una inyección de esteroides antes de la infusión, junto con acetaminofén (Tylenol) y difenhidramina (Benadryl). En los meses posteriores al tratamiento, algunas personas pueden notar infecciones más frecuentes, como resfriados

o sinusitis. Por lo general, estos no son graves. Hay algunos efectos secundarios raros pero graves del rituximab. Estos incluyen reacciones cutáneas graves y úlceras en la boca. Los pacientes que experimenten cambios en la visión, pérdida de equilibrio, dificultad para caminar o confusión deben comunicarse con sus médicos inmediatamente. Combinar el tratamiento con otros fármacos biológicos, que suprimen el sistema inmunológico [incluidos el etanercept (Enbrel), el adalimumab (Humira), el infliximab (Remicade), el certolizumab (Cimzia), el golimumab (Simponi), el abatacept (Orencia), el tocilizumab (Actemra)] puede aumentar el riesgo de infecciones graves y no se aconseja. Los medicamentos para la presión arterial pueden aumentar el riesgo de presión arterial baja durante la infusión.



### DIGALE A SU MÉDICO

**Informe a su médico si tiene problemas pulmonares o cardíacos o si alguna vez ha tenido alguna infección importante (especialmente hepatitis).** Informe a sus proveedores de atención de salud sobre todos los medicamentos que toma actualmente, incluidos los medicamentos de venta libre, los suplementos y las terapias a base de hierbas. Además, infórmeles sobre todas las reacciones alérgicas que ha tenido

a los medicamentos. Si usted es una mujer que puede quedar embarazada, es importante usar un método anticonceptivo confiable antes del tratamiento y durante los 12 meses posteriores. Dado que las vacunas no son tan efectivas por varios meses después de recibir rituximab, lo ideal es que reciba las necesarias antes de comenzar el tratamiento o entre los cursos.