



## HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


# Sarilumab (Kevzara)



### ¿QUÉ ES?

**El sarilumab (Kevzara) es un medicamento biológico aprobado actualmente para tratar a adultos con artritis reumatoide (RA) activa de moderada a grave.** Los medicamentos biológicos son proteínas diseñadas por humanos que afectan el sistema inmunológico.


El sarilumab bloquea un mensajero de inflamación llamado receptor de interleucina-6 (IL-6R). Esto mejora el dolor en las articulaciones y la inflamación de la artritis y otros síntomas causados por la inflamación.



### CÓMO TOMARLO

**Para adultos con RA,** el sarilumab se administra como una inyección subcutánea (debajo de la piel) cada 2 semanas a una dosis de entre 150 mg y 200 mg. El medicamento se puede inyectar en el muslo o el abdomen. El sitio de inyección debe rotarse para que el mismo lugar no se use varias veces. Algunos pacientes comenzarán a ver una mejoría dentro de unas pocas semanas, pero puede tomar varios meses para tener

efecto completo. El sarilumab se puede tomar solo o con metotrexato u otros medicamentos no biológicos. El sarilumab no debe administrarse en combinación con otro medicamento biológico. Los análisis de sangre se usarán para controlar los cambios en las enzimas hepáticas, el colesterol y las reducciones en el recuento de células sanguíneas mientras se toma el sarilumab.



### EFFECTOS SECUNDARIOS

**El sarilumab puede disminuir la capacidad de su sistema inmunológico para combatir infecciones.** Si presenta síntomas de una infección mientras usa este medicamento, debe suspenderlo y comunicarse con su médico. A todos los pacientes se les debe hacer una prueba de tuberculosis antes de comenzar a tomar sarilumab, aunque estos tipos de infecciones

no se han visto con frecuencia. Una rara complicación observada con el uso del sarilumab en ensayos clínicos fue la perforación intestinal o un orificio en la pared del intestino. Si tiene antecedentes de diverticulitis, o si tiene dolor abdominal o movimientos intestinales con sangre mientras toma sarilumab, debe informarlo a su médico de inmediato.



### DIGALE A SU MÉDICO

**Debe notificar a su médico si presenta síntomas de una infección,** como fiebre o tos, o si cree que está teniendo algún efecto secundario, especialmente dolor abdominal, movimientos intestinales con sangre o reacciones alérgicas. Informe a su médico si queda embarazada, planea un embarazo o si está amamantando. Asegúrese

de hablar con su médico si planea someterse a una cirugía o si planea recibir alguna vacuna viva; estas incluyen la vacuna contra el herpes zóster, la vacuna contra la gripe en aerosol nasal y otras como las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la fiebre amarilla.

Actualizado en marzo de 2019 por Paul Sufka, MD, y revisado por la Comité de Marketing y Comunicaciones del Colegio Estadounidense de Reumatología. La presente información se proporciona con el único fin de brindar educación general. Para el asesoramiento médico profesional, el diagnóstico y el tratamiento de afecciones médicas o de salud, consulte a un proveedor de atención médica calificado.

© 2019 Colegio Estadounidense de Reumatología

AMERICAN COLLEGE  
of RHEUMATOLOGY  
Empowering Rheumatology Professionals