



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


Secukinumab (Cosentyx)



¿QUÉ ES?

El secukinumab (Cosentyx) es un medicamento biológico que se usa para tratar la artritis psoriásica, la psoriasis en placa de moderada a grave y la espondilitis anquilosante. Los productos biológicos son medicamentos fabricados por el hombre a través de técnicas de ingeniería genética y estrechamente


relacionados con una proteína que se produce naturalmente en el cuerpo. El secukinumab bloquea una proteína inflamatoria llamada IL-17, con lo que mejora el dolor articular y la inflamación de la artritis y la erupción de la psoriasis.



CÓMO TOMARLO

El secukinumab es una inyección autoadministrada que viene en jeringas con una dosis de 150 mg. La dosis típica es de 150 o 300 mg por inyección. Dependiendo de su dosis, puede inyectarse 1 o 2 jeringas cada vez que se administra. El secukinumab generalmente comienza con dosis semanales durante las primeras 5 semanas, seguidas de una dosis cada mes. El medicamento se puede inyectar en el muslo o el

abdomen. El sitio de inyección debe rotarse para que el mismo lugar no se use varias veces. Algunos pacientes comenzarán a ver una mejoría dentro de unas pocas semanas, pero puede tomar varios meses para tener efecto completo. El secukinumab se puede tomar solo o con metotrexato u otros medicamentos no biológicos. El secukinumab no debería administrarse en combinación con otro medicamento biológico.



EFFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios más comunes son síntomas de resfriado, diarrea e infecciones respiratorias superiores. Se han observado casos raros de enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Muy raramente, los pacientes han desarrollado reacciones alérgicas al

secukinumab. El secukinumab puede disminuir la capacidad de su sistema inmunológico para combatir infecciones. Todos los pacientes deben someterse a una prueba de tuberculosis antes de comenzar a tomar secukinumab.



DIGALE A SU MÉDICO

Si presenta signos de infección o tiene efectos secundarios, especialmente diarrea, fiebre o reacciones alérgicas, debe dejar de tomar el medicamento y consultar a su médico. Si está embarazada o está considerando un embarazo, informe a su médico antes

de comenzar a tomar este medicamento. El secukinumab no se ha estudiado durante el embarazo o la lactancia. Asegúrese de hablar con su médico antes de recibir cualquier vacuna o someterse a una cirugía mientras esté tomando este medicamento.