



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

Teriparatida (Forteo)



¿QUÉ ES?


La teriparatida se usa en mujeres posmenopáusicas y en hombres que tienen osteoporosis y tienen un alto riesgo de fracturas óseas. A menudo se usa cuando otros tratamientos fallan o en formas graves de la enfermedad. La teriparatida por sí misma construye huesos y es diferente de otras formas de tratamiento para la osteoporosis, que previenen la degradación ósea.



CÓMO TOMARLO

La teriparatida se administra mediante inyección diaria durante dos años. El medicamento viene en un inyector, que es como un bolígrafo. Para inyectar el medicamento, coloque el inyector en el muslo o la parte superior del brazo, presione el botón y se inyectará

automáticamente. La dosis es de 20 mcg al día y está preconfigurada en el bolígrafo (inyector). El tamaño de la aguja es el mismo que el de una aguja de insulina. El inyector tiene suficiente medicina para 28 días, y el medicamento debe mantenerse refrigerado.



EFFECTOS SECUNDARIOS

Los pacientes pueden marearse dentro de las cuatro horas posteriores a la toma de las primeras dosis, pero esto desaparece en unas pocas horas. Ocasionalmente, el sitio de la inyección puede causar picazón, enrojecimiento o hinchazón. La teriparatida rara vez puede causar niveles elevados de calcio en la sangre, náuseas o articulaciones adoloridas.

La teriparatida tiene una advertencia de recuadro negro, lo que significa que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está preocupada por un mayor riesgo de cáncer. En ratas que recibieron dosis muy altas de teriparatida, se encontró un tipo de cáncer llamado sarcoma. Los estudios repetidos en monos no revelaron esto y, desde su lanzamiento para uso en humanos, solo hubo un caso de sarcoma en un paciente que tomó teriparatida.



DIGALE A SU MÉDICO

Debería notificar a su médico si tiene problemas para inyectarse; si el lugar de la inyección se pone rojo, pica, se calienta o se hincha; o si tiene dolor en las articulaciones o espasmos musculares.

Asegúrese de notificar a sus otros médicos mientras esté tomando este medicamento. Si está embarazada o está considerando un embarazo, informe a su médico antes de comenzar a tomar este medicamento. Las mujeres deben

discutir sobre el control de la natalidad con sus médicos de atención primaria o ginecólogos. Debe evitarse la lactancia materna mientras toma teriparatida porque el medicamento puede ingresar a la leche materna.

Asegúrese de hablar con su médico antes de someterse a cualquier cirugía mientras esté tomando este medicamento.