



HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

Tocilizumab (Actemra)



¿QUÉ ES?

El tocilizumab (Actemra) es un medicamento biológico aprobado para tratar a adultos con artritis reumatoide (RA) moderada o severamente activa, adultos con artritis idiopática de células gigantes (GRA), y personas de 2 años o más con artritis


idiopática juvenil poliarticular (PJIA) o artritis idiopática juvenil sistémica (SJIA). El tocilizumab bloquea la proteína inflamatoria IL-6, lo que mejora el dolor articular y la inflamación de la artritis y otros síntomas causados por la inflamación.



CÓMO TOMARLO

Para adultos con AR, el tocilizumab puede administrarse como una infusión intravenosa (inyectada directamente en la vena) cada 4 semanas, seguida de un incremento de la dosis cada 4 semanas; para la GCA, se administra una vez por semana como una inyección subcutánea, una inyección debajo de la piel; para los niños con PJIA, se administra una vez cada 4 semanas como infusión intravenosa; o una vez cada 2-3 semanas como inyección subcutánea dependiendo del peso. Para los niños con SJIA, se administra una vez cada 2 semanas como una infusión intravenosa. Cuando se usa como una inyección debajo de la piel, el medicamento se puede inyectar en el muslo o el abdomen. El sitio de la inyección debe rotarse para

que el mismo sitio no se use varias veces. La infusión o inyección del tocilizumab no debe administrarse si un adulto o niño está teniendo una enfermedad o fiebre alta en el momento de la administración del medicamento. Algunos pacientes comenzarán a ver una mejoría dentro de unas pocas semanas, pero puede tomar varios meses para tener efecto completo. El tocilizumab puede administrarse solo o con metotrexato u otros medicamentos no biológicos. El tocilizumab no debe administrarse en combinación con otros medicamentos biológicos. Mientras toma el tocilizumab, para controlar el aumento de colesterol o las enzimas hepáticas y la reducción del recuento de células sanguíneas, se usarán análisis de sangre.



EFFECTOS SECUNDARIOS

El tocilizumab puede disminuir la capacidad de su sistema inmunológico para combatir infecciones. Si desarrolla síntomas de una infección mientras usa este medicamento, debe suspenderlo y comunicarse con su médico. A todos los pacientes se les debe hacer una prueba de tuberculosis antes de comenzar a usar el tocilizumab, aunque estos tipos de infecciones no se han visto con frecuencia. Pueden ocurrir reacciones alérgicas a las infusiones de tocilizumab por vía intravenosa, que pueden incluir síntomas como fiebre y escalofríos, pero estos son poco frecuentes. El tocilizumab se ha asociado

con un aumento de los niveles de colesterol en algunos pacientes, y debe monitorearse periódicamente. Si su nivel de colesterol se eleva demasiado, es posible que deba comenzar a tomar un medicamento para disminuirlo. Una rara complicación observada con el uso del tocilizumab en ensayos clínicos fue la perforación intestinal o un orificio en la pared intestinal. Si tiene antecedentes o diverticulitis o si tiene dolor abdominal o movimientos intestinales con sangre mientras toma el tocilizumab, debe informarlo a su médico de inmediato.



DIGALE A SU MÉDICO

Debe notificar a su médico si presenta síntomas de una infección, como fiebre o tos, o si cree que está teniendo algún efecto secundario, especialmente dolor abdominal, movimientos intestinales con sangre o reacciones alérgicas. Si queda embarazada, está planeando un embarazo o si está amamantando,

asegúrese de informar a su médico. Asegúrese de hablar con su médico si planea someterse a una cirugía, o si planea recibir alguna vacuna en vivo; estas incluyen la vacuna contra el herpes zóster, la vacuna contra la gripe en aerosol nasal y otras como las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la fiebre amarilla.