



## HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE


# Ustekinumab (Stelara)



### ¿QUÉ ES?

**El ustekinumab (Stelara) es un medicamento biológico que se usa para disminuir la inflamación y ayudar a los pacientes con psoriasis en placa de moderada a grave, artritis psoriásica y enfermedad de Crohn de moderada a grave.** Este medicamento se prescribe después de que no hay respuesta a


otros medicamentos. Se toma como una inyección en la casa. El ustekinumab bloquea unas proteínas inflamatorias llamadas IL-12 e IL-23. El ustekinumab es un medicamento biológico y puede tardar varios meses en comenzar a funcionar. Los productos biológicos también se toman a menudo a largo plazo.



### CÓMO TOMARLO

**Inicialmente, se administra la inyección de ustekinumab, luego 4 semanas más tarde, seguida de cada 12 semanas.** La dosis para pacientes que pesan menos de 100 kg (220 lb) es de 45 mg, y la dosis para pacientes que pesan más de 100 kg es de 90 mg.

Necesitará una prueba de descarte de tuberculosis antes de comenzar a tomar este medicamento para reducir el riesgo de infección. Debe hacer un seguimiento con su médico regularmente mientras toma este medicamento.



### EFFECTOS SECUNDARIOS

**El ustekinumab reduce su sistema inmunológico y puede provocar infecciones.** El ustekinumab rara vez puede llevar a una condición del sistema nervioso llamada síndrome de leucoencefalopatía posterior

reversible (RPLS), que es reversible si se suspende el medicamento. Algunas personas pueden tener una reacción en el lugar de la inyección, como picazón, hinchazón y enrojecimiento.



### DIGALE A SU MÉDICO

**Si presenta síntomas de una infección, como fiebre o tos, debe comunicarse con su médico.** Si está embarazada o está considerando un embarazo, informe a su médico antes de comenzar a tomar este medicamento; el ustekinumab no se ha estudiado en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Asegúrese de hablar con su médico antes de recibir cualquier vacuna

o someterse a una cirugía mientras esté tomando este medicamento. Las vacunas vivas deben evitarse mientras se toma este medicamento. Informe a su médico de inmediato si tiene algún problema médico nuevo o que empeora, como: cambios en su estado mental, problemas de la vista, convulsiones o dolores de cabeza intensos.